

Referências:

1. SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS [Internet]. sigtap.datasus.gov.br. Available from: <http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>;
2. Ministério da Saúde [Internet]. Saude.gov.br. 2018. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2018/prt1701_16_11_2018.html;
3. Ministério da Saúde [Internet]. Saude.gov.br. 2015 [cited 2025 Jul 4]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2015/prt0662_28_07_2015.html;
4. Ministério da Saúde [Internet]. Saude.gov.br. 2015 [cited 2025 Jul 4]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2015/prt0036_15_01_2015.html

Serviço de Informações Roche
0800 • 7720 • 289
www.roche.com.br



Este material destina-se ao público brasileiro em geral.

Este material não tem a finalidade de condicionar a prescrição, uso, promoção, venda, recomendação, indicação ou endosso de nenhum produto Roche ou qualquer concessão de benefício à Roche.

Direitos reservados – é proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização de Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.

GRAVIDEZ PROIBIDA! Riscos de graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto. Produto sujeito a receita controlada, segundo Portaria N° 344 de 1º de fevereiro de 1999.

Não tome medicamentos por conta própria. Siga corretamente as orientações de seu médico. Na ocorrência de reações indesejáveis, informe imediatamente seu médico.

Para reportar um evento adverso com medicamento Roche, entre em contato com o Serviço de Informações Roche através do 0800 7720 289.

M-BR-00020593 - JULHO/2025



CÓDIGOS DE APAC PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA HER2+

CÓDIGOS DE APAC PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA HER2+



CENÁRIO INICIAL

(considerando a recomendação da DDT)

Tumor até 2cm e N-

Paciente

ESTADIO I e II

Menor agressividade



CIRURGIA

TRATAMENTOS ADJUVANTES

Máximo 3 meses

- QUIMIOTERAPIA
- +
- TRASTUZUMABE

APAC:
03.04.05.026-1 (Estadio I)
03.04.05.027-0 (Estadio II)
03.04.05.028-8 (Estadio III)

Tumor ≥ 2cm ou N+

Paciente

ESTADIO III

Maior agressividade



CIRURGIA

TRATAMENTO NEOADJUVANTE

- QUIMIOTERAPIA
AC-TH ou TCH
- +
- TRASTUZUMABE

APAC: 03.04.04.018-5
(Estadio III)
Máximo 06 meses

- TRASTUZUMABE

APAC:
03.04.05.029-6 (Estadio I)
03.04.05.030-0 (Estadio II)
03.04.05.031-8 (Estadio III)

Máximo de 9 meses
ou 12 meses, se,
respectivamente, houve
ou não poliquimioterapia
adjuvante

- TRASTUZUMABE ENTANSINA

Referências: 1. SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS [Internet]. sigtap.datasus.gov.br. Available from: <http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>; 2. Ministério da Saúde [Internet]. Saude.gov.br. 2018. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2018/prt1701_16_11_2018.html; 3. Ministério da Saúde [Internet]. Saude.gov.br. 2015 [cited 2025 Jul 4]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2015/prt0662_28_07_2015.html; 4. Ministério da Saúde [Internet]. Saude.gov.br. 2015 [cited 2025 Jul 4]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2015/prt0036_15_01_2015.html

Este material destina-se ao público brasileiro em geral. Este material não tem a finalidade de condicionar a prescrição, uso, promoção, venda, recomendação, indicação ou endosso de nenhum produto Roche ou qualquer concessão de benefício à Roche. Direitos reservados – é proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização de Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. GRAVIDEZ PROIBIDA! Riscos de graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto. Produto sujeito a receita controlada, segundo Portaria N° 344 de 1º de fevereiro de 1999. Não tome medicamentos por conta própria. Siga corretamente as orientações de seu médico. Na ocorrência de reações indesejáveis, informe imediatamente seu médico. Para reportar um evento adverso com medicamento Roche, entre em contato com o Serviço de Informações Roche através do 0800 7720 289. M-BR-00020593 - JULHO/2025

CENÁRIO METASTÁTICO

ONDE SE LÊ: DUPLO ANTI HER-2 = Trastuzumabe + Pertuzumabe

Paciente

ESTADIO IV

Maior agressividade

1º LINHA DE TRATAMENTO

- TRASTUZUMABE
- +
- PERTUZUMABE
- +
- QUIMIOTERAPIA

APAC: 03.04.02.043-5 –
Máximo 5 competências
4-6 ciclos, 3/3 semanas

- TRASTUZUMABE
- +
- PERTUZUMABE

APAC: 03.04.02.044-3
Até toxicidade ou progressão
Com justificativa



Pacientes em tratamento com duplo anti-HER2 do carcinoma de mama HER2+ 1a linha, NÃO possuem limitação de ciclos de pertuzumabe de acordo com o SIGTAP, ou seja, deve ser utilizado primeiramente o código 03.04.02.043-5 por até 5 competências seguido do código 03.04.02.044-3 até a toxicidade ou progressão da doença.

Serviço de Informações Roche

0800 • 7720 • 289

www.roche.com.br



CONCEITOS DA SIGTAP²

Inicialmente é importante esclarecer alguns termos que serão utilizados nestes relatórios

COMPATIBILIDADE^{3 e 4}

Entre dois ou mais procedimentos significa que o primeiro procedimento pode/deve ser acompanhado pelo segundo na realização do ato assistencial

EXCLUDÊNCIA^{1 e 2}

Entre dois ou mais procedimentos significa que os procedimentos não poderão ser realizados em conjunto no mesmo ato assistencial

PROCEDIMENTO:

03.04.02.043-5 - POLIQUIMIOTERAPIA COM DUPLO ANTI HER-2 DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO 1ª LINHA¹

- Poliquimioterapia paliativa com duplo anti-HER-2 do carcinoma de mama HER-2 positivo metastático para víscera (exceto cérebro) com exame imuno-histológico de 2 cruzes confirmado por exame molecular ou de 3 cruzes
- Excludente com os procedimentos 03.04.02.013-3 - quimioterapia do carcinoma de mama avançado -1ª linha, 03.04.02.034-6 - hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 1ª linha, 03.04.02.042-7 - monoquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo - 1ª linha, 03.04.02.041-9 - poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo 1ª linha e 03.04.02.044-3 - quimioterapia com duplo anti-HER-2 do carcinoma de mama HER-2 positivo - 1ª linha
- Total quatro a seis ciclos de 3/3 semanas (máximo de cinco competências mensais)

PROCEDIMENTO:

03.04.02.044-3 - QUIMIOTERAPIA COM DUPLO ANTI-HER-2 DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO – 1ª LINHA¹

- Quimioterapia com duplo anti-HER-2 que se segue à poliquimioterapia paliativa com duplo anti-her-2 do carcinoma de mama HER-2 positivo metastático para víscera (exceto cérebro) com exame imuno-histológico de 2 cruzes confirmado por exame molecular ou de 3 cruzes.
- Excludente com os procedimentos 03.04.02.013-3 - quimioterapia do carcinoma de mama avançado -1ª linha, 03.04.02.034-6 - hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 1ª linha, 03.04.02.042-7 - monoquimioterapia do carcinoma de mama her-2 positivo - 1ª linha, 03.04.02.041-9 - poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo 1ª linha e 03.04.02.043-5 - poliquimioterapia com duplo anti-her-2 do carcinoma de mama her-2 positivo - 1ª linha